

Anlage

Dokumentationsnummer *

Impfungen	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischung	Vergütung
Einfachimpfungen				
Diphtherie (Standard-Impfung) Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89100 A	89100 B	89100 R	7,18 €
Diphtherie Sonstige Indikationen	89101 A	89101 B	89101 R	7,18 €
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)	89102 A	89102 B	89102 R	9,43 €
Haemophilus influenzae Typ b (Standard-Impfung) Säuglinge und Kleinkinder	89103 A	89103 B		7,18 €
Haemophilus influenzae Typ b Sonstige Indikationen	89104 A	89104 B		7,18 €
Hepatitis A	89105 A	89105 B	89105 R	7,18 €
Hepatitis B (Standard-Impfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106 A	89106 B		7,18 €
Hepatitis B Sonstige Indikationen	89107 A	89107 B	89107 R	7,18 €
Hepatitis B Dialysepatienten	89108 A	89108 B	89108 R	7,18 €
Humane Papillomviren (HPV) Je nach Impfstoff ist im Alter von 9 bis 13 bzw. 9 bis 14 Jahren ein 2-Dosen-Impfschema mit einem Impfabstand von 5 bzw. 6 Monaten zugelassen. Bei Nachholimpfungen beginnend im Alter von >13 Jahren bzw. >14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 bzw. < 6 Monaten zwischen der 1. und 2. Dosis ist eine 3. Impfstoffdosis	89110 A			14,35 €

Dokumentationsnummer *

Impfungen	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung
<p>erforderlich.</p> <p>Eine begonnene Impfserie sollte möglichst mit dem gleichen HPV-Impfstoff vervollständigt werden (siehe auch Epidemiologisches Bulletin Nr. 16 vom 25.04.2016, S. 137).</p>				
Humane Papillomviren (HPV)		89110 B		11,48 €
		89110 B ***		11,48 €
<p>Unverändert können Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren geimpft werden. Diese Impfung ist nach dem 3-Dosen-Schema (Monat 0-2-6) durchzuführen. Eine nicht bis zum 17. Lebensjahr abgeschlossene Impfung kann über das 17. Lebensjahr hinaus vervollständigt werden. Die fehlende/n Impfung/en der begonnenen Grundimmunisierung muss/müssen vor dem 18. Geburtstag verabreicht werden, um dies noch zu Lasten der GKV abzurechnen.</p> <p>*** die GOP 89110 B wird entgegen der sonst üblichen Regelung beim Impfschema mit 3 Impfdosen für die 2. und 3. Impfleistung abgerechnet</p>				
Influenza (Standardimpfung) Personen über 60 Jahre	89111			9,43 €
Influenza Sonstige Indikationen	89112			9,43 €
Influenza nasal Sonstige Indikationen: Kinder (2 bis 6 Jahre)	89112 N			9,43 €
Masern (Erwachsene)	89113			7,18 €
Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) Kinder	89114			7,18 €
Meningokokken Sonstige Indikationen	89115 A	89115 B	89115 R**)	7,18 €

Dokumentationsnummer *

Impfungen	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) Kinder bis 24 Monate	89118 A	89118 B		9,43 €
Pneumokokken (Standardimpfung) Personen über 60 Jahre	89119		89119 R**)	9,43 €
Pneumokokken - Sonstige Indikationen	89120 ****)		89120 R	10,25 €
Poliomyelitis (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121 A	89121 B	89121 R	7,00 €
Poliomyelitis Sonstige Indikationen	89122 A	89122 B	89122 R**)	7,18 €
Rotavirus (RV) Grundimmunisierung bei Verwendung des 2-fach Impfstoffs pro Impfserie	89127 A	89127 B		8,46 €
Rotavirus (RV) Grundimmunisierung bei Verwendung des 3-fach Impfstoffs pro Impfserie	90127 A	90127 B		5,64 €
Röteln (Erwachsene)	89123			7,18 €
Tetanus	89124 A	89124 B	89124 R	6,97 €
Varizellen (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125 A	89125 B		7,18 €
Varizellen Sonstige Indikationen	89126 A	89126 B		7,18 €
Zweifachimpfungen				
Diphtherie, Tetanus (DT)	89200 A	89200 B		7,18 €
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201 A	89201 B	89201 R	7,18 €

Dokumentationsnummer *

Impfungen	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) nur bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A und eine Hepatitis B-Impfung	89202 A	89202 B		7,18 €
- Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (Hib-HB)	89203 A	89203 B		7,18 €
Dreifachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)	89300 A	89300 B		10,25 €
Masern, Mumps und Röteln (MMR)	89301 A	89301 B		16,40 €
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)	89302		89302 R***)	10,25 €
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303 R***)	10,25 €
Vierfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400 R***)	10,25 €
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401 A	89401 B		17,43 €
Fünffachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DtaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B		10,25 €
Sechsfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DtaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B		21,53 €
*)	Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Bsp.: Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten)			

Dokumentationsnummer *

Impfungen	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung
	mit Diabetes gilt als Standardimpfung (89111); Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung (89112). Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter ggf. die Nummer 89112 zweimal zu dokumentieren. Dies gilt auch für die Nummer 89112 N bei Kindern zwischen 24 Monaten und 6 Jahren.			
**)	Keine routinemäßige Auffrischung			
***)	Anmerkungen zur Pertussis-Impfung gemäß Anlage 1 SI-RL ist zu beachten Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.			
****)	Standardimpfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff (PPSV23), ggf. Wiederholungsimpfungen mit PPSV23 im Abstand von mindestens 6 Jahren nach individueller Indikationsstellung. Im Rahmen der sequentiellen Impfung ist die Nr. 89120 sowohl bei der Impfung mit PCV13 als auch PPSV23 zu verwenden. PPSV23 wird für Kinder unter 2 Jahren nicht empfohlen.			